

Patientinformation

I SAMBAND MED FÖRSKRIVNING AV TOLAK® 40MG/G KRÄM

Denna guide ska endast ges av vårdpersonal till vuxna patienter.

VAD ÄR AKTINISK KERATOS?


Aktinisk keratos är områden med solskadad hud som huvudsakligen finns på delar av kroppen som utsätts för solen, särskilt underarmarna, handryggen, ansiktet, öronen, den skalliga hårbotten och underbenen. De kan också förekomma på läpparna. Aktiniska keratoser kan vara generande, ibland kan de klia men är i allmänhet ofarliga.

Det finns en mycket liten risk att keratoserna kan utvecklas till en form av hudcancer som kallas skivepitelcancer. Patienter som har aktinisk keratos, har en högre risk för alla typer av hudcancer jämfört med människor av samma ålder utan aktinisk keratos, vilket beror på den större mängd solljus som huden har utsatts för. Patienter med störst risk är de som har många aktiniska keratoser såväl som de som får immunsuppressiva läkemedel som behandling för annan sjukdom. Aktinisk keratos är inte heller smittsam eller ärftlig.

AKTINISK KERATOS (AK)

aktinisk = orsakad av solljus, keratos = förtjockad hud

UV




Möjlig utveckling från aktinisk keratos till skivepitelcancer

HUR DU ANVÄNDER TOLAK®?

Om inte din läkare har sagt något annat till dig, ska krämen appliceras en gång om dagen i 4 veckor. Den bör appliceras i samband med sänggående:

- 1 Tvätta, skölj och klapptorka försiktigt de hudområden som ska behandlas
- 2 Applicera ett tunt lager med kräm på de områden som ska behandlas
- 3 Massera försiktigt in krämen i huden i ett jämnt lager
- 4 Tvätta händerna noga när du har applicerat krämen

BEHANDLINGSOMRÅDE




ANNAN INFORMATION:

INFORMATION OM HUR TOLAK® VERKAR

Du får troligen en rodnad i den behandlade huden.

Krämen förstör cancerceller och förstadier till cancerceller i huden och påverkar inte normala celler lika mycket. Krämen behandlar även onormala tillstånd i huden som inte har kunnat ses med blotta ögat, och dessa kan bli röda och inflammerade.

Detta följs troligen av inflammation/svullnad, eventuellt visst obehag, yttlig sårbildning och slutligen läkning. Detta är den förväntade normala reaktionen på behandlingen och betyder att krämen verkar. Hudreaktionerna är övergående och försvinner inom 2 till 4 veckor efter behandlingens slut. Det kan alltså ta cirka 4 veckor för huden att läka efter att behandlingen avslutats.



TIPS: EN MJUKGÖRANDE KRÄM KAN MINSKA HUDREAKTIONERNA. KOM IHÅG SOLKRÄM

Om du applicerar läkemedlet på kvällen kan det ofta lindra hudreaktionerna att smörja området med en oparfymerad mjukgörande kräm på morgonen.

Du bör undvika ultraviolett strålning (t.ex. solljus och solarium). Använd gärna en solkräm med hög solskyddsfaktor för att förebygga.

Tolak® (flourouracil (5-FU)) 40 mg/g kräm.

Tolak används för att behandla ett tillstånd i huden kallat aktinisk keratos (solskadad hud) av grad I och II i ansiktet, på öronen och/eller i hårbotten hos vuxna. Applicera inte Tolak på öppnar sår, skadad hud, direkt i ögonen, näsan, munnen eller på andra slemhinnor. Undvik ultraviolett strålning (t.ex. naturligt solljus eller solarier) under behandling. Sluta använda Tolak och kontakta läkare omedelbart om du får något av följande symtom: sår i munnen (mukositis), magsmärter, blodiga diarréer, kräkningar, feber eller frossa.

Ska ej användas vid amning, graviditet eller ifall du försöker bli gravid, samt ifall du är allergisk mot nötter eller soja. Vissa läkemedel kan påverka hur Tolak® fungerar eller öka sannolikheten för biverkningar. Tala därför om för din läkare vilka andra läkemedel du tar.

Läs noga igenom bipacksedeln innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. För fullständig information, se www.fass.se Pierre-Fabre Pharma Norden AB, www.pierre-fabre.com/se-se